

Therapie Diabetes mellitus beim Hund

Handhabung des Caninsulin (=Insulin)

- Insulin im Kühlschrank lagern.
- Nach Anbruch kann das Insulin 42 Tage lang verwendet werden.
- Das Fläschchen oder die Patrone kräftig schütteln (max. 60 Sek.), bis die Injektionssuspension gleichmässig milchig erscheint. Durch das Schütteln entstandener Schaum auf der sollte vor der Anwendung wieder aufgelöst sein. Sofern erforderlich nochmals sanft schwenken.
- Bitte nur die Insulinspritzen mit **40 I.U.** verwenden.

Dosierung für Ihren Hund

Morgens und abends, möglichst im 12 Stunden Abstand werden _____ I.U. (=Einheiten) unter die Haut gespritzt.

Sollte Ihr Hund nicht fressen oder erbrechen, dann nur die Hälfte der gewohnten Insulindosis spritzen.

Fütterung Ihres Hundes

Vor der Insulininjektion wird je die Hälfte der Tagesration gefüttert (bitte abwiegen). Verzichten Sie auf Leckereien zwischendurch.

Idealerweise füttern Sie eine spezielle Diät (z.B. Royal Canin Diabetic). Wir beraten Sie diesbezüglich gerne.

Symptome für Unterzuckerung (Hypoglykämie)

- Ruhelosigkeit, Zittern, Fresslust, Orientierungslosigkeit, Schwäche
- Krampfanfälle, Ataxie, Bewusstlosigkeit, Koma

Maßnahmen bei Unterzuckerung

- Füttern Sie Ihrem Hund eine kleine Portion Futter.
- Geben Sie ihm Honig, Traubenzucker oder eine Zuckerlösung ins Maul wenn er nicht fressen mag.
- Kontaktieren Sie in jedem Fall unsere Notfallsprechstunde.

Nachkontrollen

In den ersten 2 Monaten erfolgen die Nachkontrollen ca. alle 2 Wochen. Bitte füttern und spritzen Sie Ihren Hund wie gewohnt, bevor Sie zu uns kommen. Es wird ein Blutzuckertagesprofil erstellt. Ihr Liebling muss dafür den Tag über bei uns bleiben. Dies ist wichtig, um Ihren Hund optimal auf das Insulin einzustellen.

Zögern Sie nicht, uns jederzeit bei Fragen, Sorgen oder Problemen zu kontaktieren.